

Xín Màn, ngày 12 tháng 12 năm 2019

THÔNG TIN THUỐC

Kính gửi: - Các khoa lâm sàng
- Khoa khám bệnh.

Thực hiện theo sự phân công của Hội đồng thuốc và điều trị, tổ thông tin thuốc thông tin tới các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh các thuốc mới sau:

1. HALIXOL

Loại thuốc: Tây y

Dạng thuốc: Viên nén, mỗi viên chứa:

Ambroxol hydrochlorid 30mg

Tá dược: Vd

* **Chỉ định:**

Các bệnh tắc nghẽn đường hô hấp cấp tính và mãn tính như hen phế quản, viêm phế quản, giãn phế quản do sinh sản quá nhiều nhầy và đờm. Tăng cường hòa tan dịch nhầy trong các bệnh viêm mũi họng.

* **Liều lượng và cách dùng:**

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Liều khuyến cáo 2-3 ngày đầu là 1 viên x 3 lần mỗi ngày. Những ngày tiếp theo dùng liều 1 viên x 2 lần mỗi ngày hoặc ½ viên x 3 lần mỗi ngày.

+ Trẻ em 5-12 tuổi liều thường dùng là ½ viên x 2-3 lần mỗi ngày

+ Uống thuốc với nhiều nước sau khi ăn.

+ Ở bệnh nhân suy thận, cần phải giảm liều hoặc tăng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc

* **Chống chỉ định :**

- Mẫn cảm với ambroxol, bromhexine hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Các bệnh loét đường tiêu hóa.

- Phụ nữ có thai và cho con bú

* **Thận trọng**

Cần thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân không dung nạp lactose vì mỗi viên Halixol có chứa 84 mg lactose

Ghi chú: Khi cần thêm thông tin về thuốc mới xin vui lòng hỏi tư vấn của dược sỹ lâm sàng và tổ thông tin thuốc./

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu

TỔ THÔNG TIN THUỐC



Đào Thị Hương

PHÊ DUYỆT LÃNH ĐẠO



BSCKII. Vương Tiến Lương

Xín Màn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

THÔNG TIN THUỐC

Kính gửi: - Các khoa lâm sàng
- Khoa khám bệnh.

Thực hiện theo sự phân công của Hội đồng thuốc và điều trị, tổ thông tin thuốc thông tin tới các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh các thuốc mới sau:

1. BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘ

Loại thuốc: Thuốc chế phẩm y học cổ truyền

Dạng thuốc: Siro

Thành phần: Cho 1 ống 10ml

Bạch linh	72.0mg	Bán hạ chế	166.4mg
Bách bộ	572.0mg	Mơ muối	264.0mg
Cát cánh	250.4mg	Cam thảo	50.4mg
Tỳ bà diệp	260.0mg	Bạc hà	14.4mg
Tang bạch bì	250.4mg	Bạch phàn	16.0mg
Ma hoàng	54.4mg	Tinh dầu bạc hà	10.4mg
Mạch môn	250.4mg	Tá dược vđ	10ml

* Công dụng

Bổ phổi, tiêu đờm, thông hơi thở

* Chỉ định

Chống viêm nhiễm cơ quan hô hấp. Chữa ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do cảm, ho do dị ứng, ho do viêm họng- viêm phế quản.

* Chống chỉ định

- + Người mẫn cảm với cứ thành phần nào của thuốc.
- + Người tiểu đường
- + Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

* Liều dùng – cách dùng: Ngày uống 2-3 lần


- Trẻ em từ 2.5 -5 tuổi: Mỗi lần 5 ml (1/2 ống)
- Từ 6-10 tuổi: Mỗi lần 10ml (1 ống)
- Từ 11- 15 tuổi: Mỗi lần 20ml (2 ống)
- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần 30 ml (3 ống)

Ghi chú: Khi cần thêm thông tin về thuốc mới xin vui lòng hỏi tư vấn của dược sỹ lâm sàng và tổ thông tin thuốc./

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu

TỔ THÔNG TIN THUỐC



Đào Thị Hương

PHÊ DUYỆT LÃNH ĐẠO



BsCKII. Vương Tiến Lương

Xín Màn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

THÔNG TIN THUỐC

Kính gửi: - Các khoa lâm sàng
- Khoa khám bệnh.

Thực hiện theo sự phân công của Hội đồng thuốc và điều trị, tổ thông tin thuốc thông tin tới các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh các thuốc mới sau:

1. THUỐC UỐNG SUNCUMIN

Loại thuốc: Thuốc chế phẩm y học cổ truyền

Dạng thuốc: Thuốc nước uống

Thành phần: Cho 1 chai 100ml

Nghệ vàng	30g
Aspartam	6mg
Natri benzoat	0.2g
Tá dược vđ	100ml

* Tác dụng

- Điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng nhờ tác dụng chống viêm và tái tạo tế bào niêm mạc mới, thay thế tế bào bị tổn thương do rượu, stress, do tác dụng phụ của thuốc, do ăn uống, do vi khuẩn, do rối loạn tiêu hóa...

- Làm khỏe niêm mạc nhờ tác dụng hoạt huyết, tăng cường dinh dưỡng, tăng sức đề kháng của niêm mạc dạ dày, tá tràng

- Bảo vệ dạ dày nhờ kích thích tăng tiết nhày

- Nhờ đó giảm nguy cơ xuất huyết và ung thư dạ dày, ruột

* Chỉ định

Dùng trong trường hợp: viêm loét dạ dày, hành tá tràng, vùng dạ dày trướng đau, ợ hơi, ợ chua

* Cách dùng:

- Uống liền, hoặc pha thêm với nước chín hoặc đường kính cho hợp vị ngọt
- Liều điều trị: Uống liên tục 1-2 tháng, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10ml
- Liều duy trì: Ngày uống 1 lần x 10ml

- Thời gian uống: Để thuốc dễ ngấm trực tiếp và lưu lại lâu hơn ở vết viêm loét

+ Viêm loét hành tá tràng: Nên uống trước khi ăn 30-60 phút

+ Viêm loét dạ dày: Nên uống sau khi ăn

*** Chống chỉ định :**


- Không dùng cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu

Ghi chú: Khi cần thêm thông tin về thuốc mới xin vui lòng hỏi tư vấn của dược sỹ lâm sàng và tổ thông tin thuốc./

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu

TỔ THÔNG TIN THUỐC



Đào Thị Hương

PHÊ DUYỆT LÃNH ĐẠO



BsCKII. Vương Giản Lương